

Maggio 2013: secondo campo sulla migrazione del falco pecchiaiolo sulle Alpi Apuane (LU)

Guido Premuda (www.sunbird.it)

Per il secondo anno consecutivo è stata indagata la strategia migratoria e la consistenza del passaggio del falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* sulle Alpi Apuane.

Sono state coperte 13 giornate continuative dal 9 al 21 maggio, oltre ad una giornata sporadica (1 maggio) per un totale di 111,5 ore. Durante il periodo sono stati osservati complessivamente 601 rapaci migratori (indice orario: 5,4 rapaci/h). Le specie osservate, in ordine di abbondanza, sono state: falco pecchiaiolo (76%), biancone *Circaetus gallicus*, nibbio bruno *Milvus migrans*, gheppio *Falco tinnunculus*, falco di palude *Circus aeruginosus*, lodolaio *Falco subbuteo*, aquila minore *Aquila pennata*, poiana *Buteo buteo*, albanella minore *Circus pygargus*, albanella pallida *Circus macrourus*.

A conferma di quanto già ipotizzato (Premuda et al. 2010), una consistente parte (50%) del totale dei falchi pecchiaioli osservati ($N=454$) presentava una direzione da Nord-Ovest a Sud-Est in accordo con una migrazione "a circuito" analoga a quella del biancone.

Fra le rarità si segnala l'osservazione di un'albanella pallida maschio adulto il 20 maggio (E. Arcamone et al.).

Come già evidenziato nel 2012, considerando il volume di rapaci in migrazione registrato in marzo e maggio ($N=2.598$) (escluso quindi aprile con il passaggio del falco di palude come specie primaria), si può facilmente ipotizzare il passaggio di oltre 3.000 rapaci in primavera, facendo potenzialmente rientrare il *bottleneck* della Versilia tra le IBA classificate con il criterio C5 (*Large congregations of migratory raptors*).

Ringrazio vivamente Andrea Benvenuti, Fabio ed Elisabetta Viviani, Marco Franchini e il COT www.centromitologicotoscano.org, i capi-campo Lorenzo Del Chiaro, Marianna Corsinelli, Ernesto Occhiato, Daniela Giorgi, Alessandro Franchi, Gabriele Grilli, Alfredo Peghini, Franco Roscelli, Emiliano Arcamone, Enrico Meschini, Francesco Franceschi.

Bibliografia: PREMUDA G., RICCI U. & VIVIANI F., 2010 - Rapaci delle Alpi Apuane - Parco Alpi Apuane, Pacini Ed., Pisa. - www.sunbird.it/ornitos/bibliography.htm - www.sunbird.it/ornitos/AlpiApuane.htm

| Specie | N. individui |
|-----------------------------|--------------|
| <i>Pernis apivorus</i> | 454 |
| <i>Milvus migrans</i> | 30 |
| <i>Circaetus gallicus</i> | 44 |
| <i>Circus aeruginosus</i> | 11 |
| <i>Circus pygargus</i> | 1 |
| <i>Circus macrourus</i> | 1 |
| <i>Buteo buteo</i> | 4 |
| <i>Aquila pennata</i> | 8 |
| <i>Falco tinnunculus</i> | 19 |
| <i>Falco subbuteo</i> | 9 |
| rapaci indeterminati | 20 |
| Totale Falconiformes | 601 |



foto: G. Premuda